



Диагностика как отправная точка индивидуального образовательного маршрута обучающегося с расстройством аутистического спектра

Заведующий БМАДОУ
«Детский сад № 19 компенсирующего вида»,
Педагог-психолог Грошева О.В.

Клинические рекомендации

➔ https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/594_3

РУБРИКАТОР
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

О рубрикаторе | Обратная связь | Подписаться | Войти

Клинические рекомендации | Справочники | Алгоритмы действий врача | О разработке КР | Портал общественного обсуждения | Архив

Главная / Клинические рекомендации / Расстройства аутистического спектра

Расстройства аутистического спектра

ID:
594_3

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем:
F84.0, F84.1, F84.4, F84.5, F84.8, F84.9

Возрастная категория: Дети | Специальность:

Год утверждения: 2024 | Пересмотр не позднее: 2026 | Дата размещения КР: 26.08.2024

Статус: Действует | Статус применения: Применяется

Статус одобрения НПС: Да

Разработчик клинической рекомендации:
Ассоциация психиатров и психологов за научно-обоснованную практику, Союз педиатров России

Приложения к клиническим рекомендациям:

- [Приложение А1. Состав рабочей группы](#)
- [Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций](#)
- [Приложение А3. Справочные материалы](#)
- [Приложение Б. Алгоритмы действий врача](#)
- [Приложение В. Информация для пациента](#)
- [Приложение Г1 - Г... Шкалы оценки, вопросники](#)

Скачать в .pdf | Открыть

Клинический диагноз МКБ 10.

Этот класс содержит следующие блоки:

- F00-F09 Органические, включая симптоматические, психические расстройства
- F20-F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
- F70-F79 Умственная отсталость
- F80-F89 Расстройства психологического развития
- F90-F98 Эмоциональные расстройства, расстройства поведения, обычно начинающиеся в детском и подростковом возрасте
- F99-F99 Неуточненные психические расстройства

Стандартизированные методики, входящие в клинические рекомендации Минздрава России по РАС

- M-CHAT-R <https://test.autism.help/>
- Leiter-3 – Международные шкалы продуктивности (Для детей от 3-х лет и взрослых).
- CASD – опросник расстройств аутистического спектра (Для детей от 1 года до 16 лет).
- SCQ – социально-коммуникативный опросник. (Для детей старше 4-х лет, умственный возраст от 2-х лет, и взрослых).
- ADOS-2 – план диагностического обследования при подозрении на аутизм (Для детей от 1 года и взрослых).
- ADI-R – интервью при диагностике аутизма (Для детей от 2-х лет и взрослых).
Используется вместе с ADOS-2.
- MPR – шкалы развития (Для детей от 1 месяца и до 6,5 лет).

ADOS-2 - план диагностического обследования при аутизме

Это стандартизированная методика, позволяющая, при наличии подозрения на расстройства аутистического спектра, оценивать особенности общения, социального взаимодействия и игры.

- ▶ применяется у лиц от 1 года при подозрении на аутизм

Правообладатель: © 2012, Western Psychological Services, USA

Авторы: Catherine Lord, Ph.D., Michael Rutter, M.D., FRS, Pamela C. Dilavore, Ph.D., Katherine Gotham, Ph.D., Somer L. Bishop, Ph.D., Rhiannon J. Luyster, Ph.D., Whitney Guthrie, Ph.D.

Адаптация русскоязычной версии: © 2016
Giunti Psychometrics (Россия), А. Сорокин, Е.
Давыдова, К. Салимова при участии Е.
Пшеничной



Возможности ADOS-2:

- ▶ Может применяться для обследования лиц различного уровня развития, владения экспрессивной речью и хронологического возраста.
- ▶ Структурированные виды деятельности и материалы методики позволяют создать стандартные ситуации, в которых могут проявиться формы поведения, важные для диагностики аутизма.
- ▶ Включает в себя пять модулей для различных категорий пациентов. Для каждого обследуемого используется только один модуль, который соответствует определенному уровню развития экспрессивной речи и возрасту. Для прохождения любого модуля требуется 40-60 минут.

ADOS-2 позволяет оценивать несколько клинических групп людей:

- **Модуль Т:** предназначен для использования при обследовании детей от 12 до 30 месяцев, не владеющих регулярной фразовой речью.
- **Модуль 1:** предназначен для использования при обследовании детей в возрасте от 31 месяца, не владеющих регулярной фразовой речью.
- **Модуль 2:** предназначен для использования при обследовании детей любого возраста, которые используют фразовую речь, однако не владеют беглой речью.
- **Модуль 3:** предназначен для использования при обследовании детей и подростков, владеющих беглой речью.
- **Модуль 4:** предназначен для использования при обследовании старших подростков и взрослых, владеющих беглой речью.



Параметры тестирования

- Речь и коммуникация
 - Социальное взаимодействие
 - Игра
 - Стереотипное поведение и ограниченные области интереса
- 

Диагностические группы по ADOS-2

- Аутизм
- Спектр аутизма

Диагностическая группа по ADOS-2 не является клиническим диагнозом и отражает только формы поведения и особенности общения, отмеченные во время обследования. Результаты должны интерпретироваться только специалистом на основании тщательного анализа истории развития и медицинских данных.

Checklist for Autism Spectrum Disorder (CASD) – опросник расстройств аутистического спектра

- Цели CASD: диагностика
- ❖ Применяется у лиц с подозрением на аутизм от 1 до 16 лет.
- ❖ Надежный, удобный (требуется 15 минут) и недорогой инструмент для диагностики аутизма, могут самостоятельно заполнять родители или опекуны.
- ❖ **Единственный диагностический инструмент, созданный для оценки аутистических расстройств единого спектра, в отличие от других методик, оценивающих расстройства по подтипам заболевания.**
- ❖ Если полученные результаты превышают рубеж в 15 баллов – это диапазон аутизма. Баллы 11-14 являются показателем пограничного состояния или неуточненного первазивного (общего) расстройства развития.
- ❖ Многим детям с аутизмом были поставлены диагнозы: речевые нарушения, расстройства настроения, СДВГ и пр., до того, как у них был обнаружен аутизм. CASD помогает родителям осознать, что все эти проблемы попадают под категорию симптомов, характерных для аутизма.




SCQ – СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНЫЙ ОПРОСНИК

- ❖ Применяется для беседы с родителями и опекунами детей старше 4х лет (умственный возраст от 2х лет) и взрослых с подозрением на аутизм.
- ❖ Является скрининговой методикой, основанной на опросе родителей, помогающей выявить симптомы, связанные с расстройством аутистического спектра (РАС).
- ❖ Ответы на 40 вопросов в формате да/нет, на это родителю или опекуну требуется не более 10 минут на заполнение анкеты, а лицу, применяющему методику, - менее 5 минут на подсчет результатов.
- ❖ Это инструмент для количественного измерения симптомов РАС, пороговое значение используют для определения вероятности присутствия РАС у ребенка.

Автономная Некоммерческая Организация
Социального Обслуживания
Людей с Инвалидностью «Сейчасъе»

<https://vk.com/happinow>

Сайт <https://happinow.cityofhappiness.ru/>





**ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ**

Спасибо за внимание!

